

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (3)

opportunistes peut être observée après la mise sous traitement (rétinite, pneumocystose, infection à Mycobactéries, dont la tuberculose), au début de la restauration immunitaire.

- Vous devez être informé(e) que la prise d'un traitement antirétroviral efficace, selon les connaissances actuelles, ne prévient pas complètement le risque de transmission du VIH, et que l'utilisation du préservatif reste recommandée.

EFFETS INDÉSIRABLES (1)

LES EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUEMMENT RAPPORTÉS SONT LES SUIVANTS :

- Hypersensibilité (VOIR PARAGRAPHE "PRÉCAUTIONS D'EMPLOI").
- Troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte d'appétit).
- Maux de tête, fièvre, douleurs musculaires, fatigue.
- Éruption cutanée.
- Chute des globules blancs neutrophiles (neutropénie), anémie, anomalies des tests biologiques de la fonction hépatique ou pancréatique. Anomalies du bilan lipidique (graisses) ou glycémique (sucres).

.../...

EFFETS INDÉSIRABLES (2)

- Anomalies de la répartition des graisses (lipoatrophie, lipodystrophie) sans que la responsabilité de l'abacavir en particulier soit clairement établie.
- En cas de doute, d'intolérance plus rare et non décrite ici, et en particulier d'apparition retardée de nouveaux symptômes, n'hésitez pas à demander rapidement un avis médical.
- Des données contradictoires ont été publiées quant à un éventuel risque cardio-vasculaire lié à l'utilisation de l'abacavir. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions définitives ni des recommandations particulières pour l'instant.
- Des cas d'acidose lactique (acidité trop élevée du sang) ont été observés avec les inhibiteurs nucléosidiques. Une surveillance particulière doit être effectuée en cas d'apparition de nouveaux symptômes à distance du début du traitement (essoufflement, fatigue, troubles digestifs, amaigrissement) ou d'anomalies hépatiques. Une prise en charge rapide est nécessaire dans ce cas afin d'évaluer la réalité de l'acidose lactique qui, si elle est confirmée, nécessite hospitalisation et arrêt immédiat du traitement.

INTERACTIONS

LES INTERACTIONS LES PLUS IMPORTANTES SONT REPORTÉES ICI. POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT LES INTERACTIONS AVEC VOS MÉDICAMENTS USUELS, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER À LA RÉGLETTE D'INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, ÉDITÉE PAR ACTIONS TRAITEMENTS (à commander au 01 43 67 20 60).

- Le risque d'interactions avec d'autres médicaments est faible.
- Les personnes recevant de la méthadone doivent être suivies attentivement, une augmentation de la dose de ce produit pouvant être éventuellement nécessaire pour éviter un état de manque.
- L'utilisation avec le tenofovir (Viread®, Truvada®) n'est pas recommandée en raison d'une possible interaction entre les deux molécules pouvant conduire à une perte d'efficacité.
- L'association avec le tipranavir (Aptivus®) n'est pas recommandée car elle peut conduire à une diminution d'efficacité de l'abacavir.
- L'association avec la ribavirine peut conduire à une baisse d'efficacité de la ribavirine et à la nécessité d'adapter les doses de cette molécule.
- L'association avec la rifampicine, ainsi que le phénobarbital et la phénytoïne (anticonvulsivants) peut entraîner une diminution d'efficacité de l'abacavir. Ses conséquences cliniques ne sont pas connues.
- L'absorption d'alcool augmente les concentrations de Ziagen®, avec un risque d'augmentation des effets indésirables.

GROSSESSE & ALLAITEMENT

- L'innocuité de Ziagen® pendant la grossesse n'a pas été démontrée. Son administration pendant cette période n'est pas recommandée, sauf en cas de nécessité.
- On ne sait pas si l'abacavir passe dans le lait maternel. Chez les femmes infectées par le VIH (même traitées), il est recommandé de ne pas allaiter pour éviter la transmission post-natale du virus.



Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin. Notre permanence téléphonique est un service quotidien, assuré par des personnes vivant avec le VIH, formées à la thérapeutique et ayant l'expérience vécue des traitements. Ce service est à votre disposition.

Ligne info traitements : 01 4367 0000 tous les jours ouvrés de 15h00 à 18h00.

VOUS POUVEZ DÉCLARER AUX AUTORITÉS DE SANTÉ LES EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS CONSTATEZ. CONTACTEZ-NOUS, NOUS VOUS INFORMERONS SUR CETTE DÉMARCHE QUI PEUT ÊTRE ANONYME.

INFOCARTE
Ziagen®
a b a c a v i r



LIGNE INFO TRAITEMENTS **01 4367 00 00**



www.actions-traitements.org

l'information sur les traitements du VIH par ceux qui les prennent

EDITION JUIN 2010

FICHE SIGNALÉTIQUE

NATURE	ANTIRÉTROVIRAL
NOM COMMERCIAL	ZIAGEN®
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE (DCI)	ABACAVIR
FAMILLE	INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE
LABORATOIRE	VIIV HEALTHCARE
PRÉSENTATION	COMPRIMÉS À 300 MG SOLUTION BUVABLE À 20 MG/ML
DISPONIBILITÉ	PHARMACIE DE VILLE ET HOSPITALIÈRE

PLANIFICATION DES PRISES

(taille réelle)



MATIN

SOIR

ou

UNE FOIS PAR JOUR

QU'EST-CE QUE ZIAGEN® ?

- Ziagen® est un médicament antirétroviral contre le VIH, utilisé en association avec d'autres antirétroviraux de la même classe ou de classes différentes, chez l'adulte et l'enfant entre trois mois et douze ans.
- Les inhibiteurs de la transcriptase inverse bloquent l'enzyme qui permet la transcription du patrimoine génétique du VIH avant son inclusion dans le noyau de la cellule cible du virus.

CONSERVATION

- Il est recommandé de conserver Ziagen® à une température ambiante inférieure à 30°C.
- Ne pas conserver la solution buvable plus de deux mois après l'ouverture du flacon.

EFFETS BÉNÉFIQUES

- Ziagen® est prescrit dans le cadre de multithérapies, associant plusieurs médicaments antirétroviraux. L'objectif de ces traitements est de réduire la répllication du virus (la charge virale) en dessous du seuil de détection dans le sang. Dans ce cadre, Ziagen® contribue à restaurer et à préserver votre système immunitaire, ce qui se traduit la plupart du temps par une remontée des lymphocytes CD4 (T4). Il s'ensuit alors une réduction du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes.

UTILISATION & OBSERVANCE

- La posologie recommandée est de un comprimé à 300 mg matin et soir ou de deux comprimés une fois par jour.
- L'activité anti-VIH de votre thérapie est maximale si vous respectez les doses et les modalités de prise. Il ne faut pas interrompre ni modifier le traitement en cours sans l'avis de votre médecin. Dans le cas contraire, vous vous exposez à l'apparition de souches virales résistantes, pouvant compromettre l'efficacité des traitements ultérieurs.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à l'abacavir.
- Insuffisance hépatique sévère.

(VOIR LES PARAGRAPHES "PRÉCAUTIONS D'EMPLOI" ET "INTERACTIONS")

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (1)

- La mise sous traitement par abacavir doit être précédée du dépistage d'un gène qui, quand il est présent, indique une forte probabilité d'hypersensibilité au médicament. L'abacavir ne doit pas être utilisé chez les patients porteurs de ce gène à moins qu'aucune autre alternative thérapeutique ne soit possible.
- Une bonne observance diminue le risque d'hypersensibilité.
- Une carte de mise en garde est incluse dans chaque boîte de Ziagen®. N'hésitez pas à la consulter.
- Le principal risque au cours de l'utilisation de Ziagen® est celui de l'apparition d'une réaction d'hypersensibilité (4 % des cas environ si le test indiqué ci-dessus n'est pas pratiqué), qui peut se produire dans les six à huit premières semaines du traitement, mais peut survenir plus tardivement.
- Les symptômes de cette hypersensibilité peuvent être divers : toux, essoufflement, maux de gorge, éruption

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (2)

- cutanée, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires ou musculaires, troubles digestifs ; le médecin doit être immédiatement consulté, et décidera ou non de poursuivre le traitement en fonction de l'importance des symptômes et de leur cause probable.
- Quand le traitement a été arrêté en raison d'une hypersensibilité, il ne doit jamais être repris par la suite, en raison d'un risque de réaction très grave, dès les premières heures. Il est préférable de rapporter le produit restant à la pharmacie pour éviter tout risque d'erreur. Ceci concerne également Kivexa® et Trizivir®, qui contiennent aussi de l'abacavir.
- L'utilisation de Ziagen® n'est pas recommandée en cas d'insuffisance hépatique modérée, à moins qu'elle soit jugée nécessaire. Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique sévère.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous fumez ou souffrez de maladies augmentant votre risque d'avoir une maladie cardiaque, telles qu'une tension artérielle élevée ou un diabète, informez-en votre médecin.
- En cas de déficit immunitaire sévère avant traitement, une aggravation inflammatoire de certaines maladies