

Faits marquants

En 2010, 1 643 Franciliennes de 15-54 ans ont participé à l'enquête du Baromètre santé de l'INPES. Sur l'ensemble des Franciliennes a priori concernées par la contraception, près de 91% ont recours à une méthode contraceptive. Près de 30% de celles ayant déjà eu des rapports sexuels déclarent avoir déjà eu recours à la contraception d'urgence. Les Franciliennes déclarent plus fréquemment avoir déjà eu une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou une infection sexuellement transmissible (IST) que les femmes des autres régions.

Contraception actuelle

Méthodes de contraception déclarées par les femmes de 15 - 54 ans a priori concernées par la contraception

%	15 - 29 ans		30 - 39 ans		40 - 54 ans		Total	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF
Méthode médicale seule	62,5	66,5	71,6	77,9	69,0	75,7	67,7**	73,5
<i>dont pilule</i>	51,5	57,2	41,1	44,4	30,1	31,4	40,9	43,7
<i>dont DIU</i>	4,1	5,7	24,7	28,4	33,6	37,0	20,9	24,4
Préservatif seul	9,4	8,0	13,3	8,2	12,7	9,1	11,8*	8,5
Double contraception	16,5	19,4	6,6	3,7	3,3	2,6	8,7	8,2
<i>dont pilule + préservatif</i>	16,2	18,3	5,0	3,1	2,8	1,6	7,9	7,3
Autres méthodes	0,5	0,6	0,9	1,4	7,4	3,0	2,9	1,7
Pas de contraception	11,2	5,4	7,7	8,8	7,6	9,6	8,8	8,0

Source : Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
 Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF - ** p<0,01, * p<0,05

Sur l'ensemble des Franciliennes âgées de 15-54 ans a priori concernées par la contraception 8,8% n'utilisent pas de contraception. Il n'y a pas de différence significative entre le taux de contraception des femmes d'Île-de-France et celui des femmes des autres territoires de France.

La pilule est la méthode majoritairement utilisée (48,8% dont 7,9% de pilule + préservatif). Ensuite viennent le DIU (20,9%) et le préservatif masculin ou féminin (19,7%). On remarque que les femmes déclarent moins souvent utiliser une méthode contraceptive médicale seule en Île-de-France que dans les autres territoires métropolitains, mais davantage le préservatif seul.

En Île-de-France comme dans les autres régions, les jeunes utilisent plus souvent une double méthode de contraception que leurs aînées (16,5% des 15-29 ans contre 3,3% des 40-54 ans). L'utilisation d'une méthode de contraception médicale seule concerne environ deux femmes sur trois pour chaque tranche d'âge. Par contre, l'utilisation du préservatif, associé

Femme a priori concernée par la contraception : femme sexuellement active dans les 12 derniers mois, non ménopausée, non enceinte, en couple ou déclarant une relation amoureuse stable et non exclusivement homosexuelle, non stérile et ne cherchant pas à avoir d'enfant

Méthode contraceptive médicale : pilule, dispositif intra-utérin (DIU), implant, patch contraceptif, anneau vaginal, stérilisation

Double contraception : méthode médicale et préservatif

Autres méthodes contraceptives : crèmes spermicides, ovules, éponges, retrait avant éjaculation, éviction des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse, méthode Ogino

ou non à une autre contraception, passe de 25,9% chez les 15-29 ans à 16,0% chez les 40-54 ans.

L'utilisation de la pilule seule, en Île-de-France comme dans le reste de la France, diminue avec l'âge (51,5% chez les 15-29 ans et 30,1% chez les 40-54 ans) au profit d'autres méthodes médicales comme le DIU ou d'autres méthodes contraceptives (respectivement 33,6% et 7,4% des 40-54 ans).

Contraception d'urgence

Recours à la contraception d'urgence chez les femmes de 15 - 54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

%	15 - 29 ans		30 - 39 ans		40 - 54 ans		Total	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF
Au moins une fois au cours de la vie	50,9	36,9	26,5	19,7	14,2	8,5	29,1***	19,8
Au moins une fois au cours des 12 derniers mois	13,3	9,7	4,0	2,8	0,6	0,8	5,5***	3,9

Source : Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
 Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF - *** p<0,001

Près d'un tiers (29,1%) des Franciliennes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels déclare avoir au moins une fois eu recours à la contraception d'urgence.

Ce niveau de recours au cours de la vie est supérieur à la moyenne hors Île-de-France (19,8%).

Cette différence se retrouve avec le recours dans les 12 derniers mois (5,5% des Franciliennes et 3,9% des Françaises hors Île-de-France).

Ces proportions de recours varient avec l'âge. Plus de la moitié

des jeunes femmes de 15-29 ans déclare avoir au moins une fois eu recours à la contraception d'urgence au cours de sa vie contre 14,2% chez les 40-54 ans et 13,3% des 15-29 ans y ont eu recours dans les 12 derniers mois contre 0,6% des 40-54 ans.

Contraception d'urgence

Utilisée après un rapport sans protection ou en cas d'oubli de pilule, rupture du préservatif... Celle-ci est distribuée à titre gracieux pour les mineures, sans ordonnance, en pharmacie, auprès d'une infirmière scolaire ou dans un centre de planification depuis le décret du 27 mars 2001.

Interruption volontaire de grossesse (IVG)

Plus d'une Francilienne sur cinq (21,5%) sexuellement active déclare avoir déjà eu recours à une IVG. Ce taux est plus élevé en Île-de-France que dans les autres régions de France (17,6%).

Les jeunes franciliennes de 15-29 ans sont 18,1% à déclarer avoir eu recours à l'IVG. Ce taux est comparable à celui observé chez les Franciliennes de 30-39 ans. Le recours au cours de la vie est plus important chez les Franciliennes de 40-54 ans (26,0%).

Pour les deux classes d'âge extrêmes, les Franciliennes sont plus nombreuses à déclarer une IVG que les femmes des autres régions de France.

Les données de l'enquête ne permettent pas d'avoir l'âge à la première IVG ni la date de la dernière IVG.

Infection sexuellement transmissible (IST)


La déclaration d'IST est plus fréquente chez les Franciliennes par rapport aux femmes des autres territoires.

Parmi les Franciliennes de 15-54 ans sexuellement actives, 7,6% déclarent avoir déjà eu au moins une IST au cours des 5 dernières années.

Les jeunes Franciliennes sont plus nombreuses à déclarer une IST dans les 5 dernières années (11,3%) par rapport à leurs aînées (3,5% des 40-54 ans) et elles sont deux fois plus nombreuses que les femmes du même âge sur le reste du territoire (5,2%).


Chlamydia, gonocoque, herpès génital, papillomavirus et infections urinaires ont été pris en compte comme IST. Afin de mieux cibler les IST dues à un rapport non protégé, les mycoses ne sont pas prises en compte dans l'analyse.

Interruption volontaire de grossesse au cours de la vie chez les femmes de 15 - 54 ans (%)



Source: Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF - * p < 0,05

IST (hors mycose) au cours des 5 dernières années chez les femmes de 15 - 54 ans (%)



Source: Baromètre santé 2010, INPES - Exploitation ORS Île-de-France
Test réalisé exclusivement sur le total IdF / hors IdF - *** p < 0,001

Certains indicateurs montrent une plus grande prise de risque en Île-de-France que dans les autres territoires de France. Ils peuvent également refléter un meilleur accès aux systèmes de soins (accès à la contraception d'urgence et aux structures qui proposent des IVG ou des dépistages).

Méthodologie générale

En 2010, l'INPES a reconduit le Baromètre santé, qui aborde les différents comportements et attitudes de santé de la population résidant en France métropolitaine. L'échantillon national est composé de 27 653 personnes âgées de 15 à 85 ans dont 4 440 Franciliens (1 952 hommes et 2 488 femmes).

Les tests de comparaison IdF / hors IdF, réalisés à partir de régressions logistiques, ont été effectués en ajustant sur le sexe, l'âge et le diplôme. Le seuil de significativité est fixé à 5%.

Voir la fiche : « Méthodologie de l'enquête Baromètre santé 2010 de l'INPES - Exploitation francilienne »

Synthèse et analyse réalisées par Valérie Féron, Nathalie Beltzer, Catherine Vincelet et Claire Sauvage (ORS Île-de-France).

Nous remercions François Beck, Arnaud Gautier, Nathalie Lydié, Delphine Kersaudy-Rahib et Jean-Baptiste Richard de l'INPES pour la mise à disposition des données et la contribution aux analyses.



ORS Île-de-France
43, rue Beaubourg
75003 Paris
tél.: 01.77.49.78.60
www.ors-idf.org

Directrice de l'ORS Île-de-France : Nathalie Sénécal
Directeur de publication : François Dugeny

L'ORS Île-de-France, département autonome de l'IAU Île-de-France, est un observatoire scientifique indépendant financé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et le Conseil régional d'Île-de-France

