





























Nom générique	Nom commercial	Préparation	Posologie adulte	Nombre de pilules/jour	Principaux effets secondaires	Restrictions alimentaires	
<b>Schémas thérapeutiques à comprimé unique</b>							
<b>Dolutégravir / abacavir / lamivudine</b>	Triumeq		Comprimés combinant 50mg de dolutégravir, 600mg d'abacavir et 300mg de lamivudine.	Un comprimé une fois par jour	1	Voir dolutégravir, abacavir et lamivudine	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Efavirenz / emtricitabine / ténofovir</b>	Atripla		Comprimés combinant 600mg d'efavirenz, 200mg d'emtricitabine et 245mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir l'efavirenz, l'emtricitabine et le ténofovir	A prendre à jeun, de préférence au moment de se coucher
<b>Elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / ténofovir</b>	Stribild		Comprimés combinant 150mg d'elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg d'emtricitabine et 245mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, rêves anormaux, céphalées, fatigue, vertiges, insomnie, éruptions cutanées, flatulence, somnolence <b>Rares:</b> Troubles hépatiques graves, troubles rénaux, perte de densité osseuse	A prendre avec les repas
<b>Rilpivirine / emtricitabine / ténofovir</b>	Eviplera		Comprimés combinant 25mg de rilpivirine, 200mg d'emtricitabine et 245mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir la rilpivirine, l'emtricitabine et le ténofovir	A prendre avec les repas
<b>Associations médicamenteuses à dose fixe</b>							
<b>Abacavir / lamivudine</b>	Kivexa		Comprimés combinant 600mg d'abacavir et 300mg de lamivudine	Un comprimé une fois par jour	1	Voir l'abacavir et la lamivudine	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Abacavir / lamivudine / zidovudine</b>	Trizivir		Comprimés combinant 300mg d'abacavir, 150mg de lamivudine, et 300mg de zidovudine	Un comprimé une fois par jour	2	Voir l'abacavir, la lamivudine et le zidovudine	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Emtricitabine / ténofovir</b>	Truvada		Comprimés combinant 200mg d'emtricitabine et 245mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir l'emtricitabine et le ténofovir	A prendre de préférence avec les repas, mais peut aussi être pris à jeun
<b>Lamivudine / zidovudine</b>	Combivir		Comprimés combinant 150mg de lamivudine et 300mg de zidovudine	Un comprimé deux fois par jour	2	Voir le lamivudine et le zidovudine	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)</b>							
<b>Abacavir</b>	Ziagen		Comprimés de 300mg	300mg deux fois par jour ou 600mg une fois par jour	2	<b>Fréquents:</b> Nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, céphalées, douleurs abdominales, fatigue, perte d'appétit <b>Rares:</b> Réaction d'hypersensibilité, acidose lactique	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Emtricitabine</b>	Emtriva		Gélules de 200mg	200mg une fois par jour	1	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, céphalées, élévation de la créatine kinase, hyperpigmentation <b>Rares:</b> Acidose lactique, troubles hépatiques	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Lamivudine</b>	Epivir		Comprimés de 150* et de 300mg	150mg deux fois par jour ou 300mg une fois par jour	2 1	<b>Fréquents:</b> Nausées, vomissements, diarrhées, céphalées, douleurs abdominales, chute des cheveux, fièvre, insomnie (troubles du sommeil), éruptions cutanées, fatigue, douleurs articulaires <b>Rares:</b> Acidose lactique, troubles hépatiques	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Zidovudine</b>	Retrovir		Gélules de 100 et de 250mg*	250mg deux fois par jour	2	<b>Fréquents:</b> Nausées, vomissements, fatigue, céphalées, vertiges, faiblesse, douleurs musculaires, perte d'appétit, fièvre <b>Rares:</b> Troubles sanguins, lipotrophie, acidose lactique	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI)</b>							
<b>Ténofovir</b>	Viread		Comprimés de 245mg	245mg une fois par jour	1	<b>Fréquents:</b> Nausées, vomissements, diarrhées, flatulence, vertiges, taux faible de phosphates plasmatiques (hypophosphatémie), faiblesse, éruptions cutanées, céphalées, maux d'estomac, fatigue, ballonnement <b>Rares:</b> Troubles rénaux, perte de densité osseuse	A prendre avec les repas
<b>Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)</b>							
<b>Efavirenz</b>	Sustiva Stocrin		Comprimés* de 600mg et gélules de 200mg	600mg une fois par jour	1 ou 3	<b>Fréquents:</b> Éruptions cutanées, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, troubles de la concentration, nausées, vomissements, céphalées, fatigue, diarrhées, anxiété, dépression, idées suicidaires <b>Rares:</b> Psychose, éruptions cutanées graves, troubles hépatiques	A prendre à jeun, de préférence au moment de se coucher
<b>Etravirine</b>	Intelence		Comprimés de 100 et de 200mg*	200mg deux fois par jour	2 ou 4	<b>Fréquents:</b> Éruptions cutanées, neuropathie périphérique <b>Rares:</b> Éruptions cutanées graves (Syndrome de Stevens Johnson)	A prendre avec les repas
<b>Nevirapine</b>	Viramune		Comprimés de 200mg	200mg une fois par jour pendant deux semaines puis 200mg deux fois par jour	2	<b>Fréquents:</b> Toxicité hépatique, réaction allergique, éruptions cutanées, nausées, céphalées, fatigue, maux d'estomac, diarrhées <b>Rares:</b> Éruptions cutanées graves (Stevens Johnson syndrome)	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Nevirapine</b>	Viramune prolonged-release		Comprimés de 400mg	400mg une fois par jour après une période initiale sous névirapine à libération non prolongée	1	<b>Fréquents:</b> Toxicité hépatique, réaction allergique, éruptions cutanées, nausées, céphalées, fatigue, maux d'estomac, diarrhées <b>Rares:</b> Éruptions cutanées graves (Syndrome de Stevens Johnson)	A avaler entier. A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Rilpivirine</b>	Edurant		Comprimés de 25mg	25mg une fois par jour	1	<b>Fréquents:</b> Insomnie (troubles du sommeil), céphalées, éruptions cutanées, élévations des enzymes hépatiques, dépression, vertiges, maux d'estomac, vomissements <b>Rares:</b> Peut provoquer des troubles du rythme cardiaque aux doses supérieures	A prendre avec les repas
<b>Inhibiteurs de la protéase</b>							
<b>Atazanavir</b>	Reyataz		Gélules de 150, 200 et 300mg* capsule	300mg avec 100mg de ritonavir une fois par jour	2 ou 3 §	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, éruptions cutanées, douleurs abdominales, céphalées, insomnie (troubles du sommeil), vomissements, hyperbilirubinémie, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète <b>Rares:</b> Calcul rénaux, fonction hépatique anormale, modifications du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
<b>Darunavir</b>	Prezista		Comprimés de 600mg* et de 800mg	800mg avec 100mg de ritonavir une fois par jour ou 600mg avec 100mg de ritonavir deux fois par jour	2 à 4 §	<b>Fréquents:</b> Diarrhées, Nausées, éruptions cutanées, maux d'estomac, vomissements, céphalées, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, fièvre <b>Rares:</b> Fonction hépatique anormale, modifications du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
<b>Fosamprenavir</b>	Telzir		Comprimés de 700mg	700mg avec 100mg de ritonavir deux fois par jour	4 §	<b>Fréquents:</b> élévation des lipides, nausées, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées, douleurs abdominales, céphalées, vertiges, fatigue, sensation de picotement autour de la bouche (paresthésie orale), changements dans les fonctions hépatiques et pancréatiques, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète <b>Rares:</b> Éruptions cutanées graves, modifications du rythme cardiaque	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Lopinavir / ritonavir</b>	Kaletra		Comprimés combinant 200mg de lopinavir et 50mg de ritonavir	Deux comprimés deux fois par jour ou quatre comprimés une fois par jour	4	<b>Fréquents:</b> Lipodystrophie, élévation des enzymes hépatiques, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, faiblesse, reflux gastrique, céphalées, élévation des lipides, toxicité hépatique, diabète <b>Rares:</b> Modifications du rythme cardiaque	Comprimés à avaler entiers. A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Ritonavir</b>	Norvir		Comprimés de 100mg	Dose complète: 600mg deux fois par jour Pour potentialiser d'autres inhibiteurs de protéase : 100-200mg une fois ou deux fois par jour	12 1 à 4	<b>Fréquents (Dose complète):</b> élévation des lipides et des enzymes hépatiques, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, céphalées, faiblesse, engourdissement autour de la bouche, sensation de mauvais goût dans la bouche, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète <b>Fréquents (Dose réduite):</b> élévation des lipides <b>Rares:</b> Modifications du rythme cardiaque	Comprimés à avaler entiers. A prendre avec les repas pour éviter les nausées
<b>Tipranavir</b>	Aptivus		Gélules de 250mg	500mg avec 200mg de ritonavir deux fois par jour	8 §	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, céphalées, fièvre, anomalies de la fonction hépatique, éruptions cutanées, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, élévation des lipides, flatulence <b>Rares:</b> hémorragie intracrânienne, modifications du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
<b>Inhibiteurs de CCR5</b>							
<b>Maraviroc</b>	Celsenti		Comprimés de 150* et de 300mg	300mg deux fois par jour ou 150mg deux fois par jour avec un inhibiteur de protéase potentialisé au ritonavir à l'exception du tipranavir et du fosamprenavir ou 600mg deux fois par jour avec de l'efavirenz ou de l'etravirine sans inhibiteur de protéase potentialisé au ritonavir	2 à 4	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, fatigue, céphalées <b>Rares:</b> Réaction allergique, troubles hépatiques	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Inhibiteurs de l'intégrase</b>							
<b>Dolutégravir</b>	Tivicay		Comprimés de 50mg	50mg une fois par jour ou 50mg deux fois par jour si pris avec de l'efavirenz, de la nevirapine ou du tipranavir, ou dans les cas de VIH résistants aux inhibiteurs de l'intégrase	1 ou 2	<b>Fréquents:</b> Nausées, diarrhées, céphalées, éruptions cutanées, démangeaisons, vomissements, douleurs ou gênes abdominales, insomnie (troubles du sommeil), vertiges, rêves anormaux, fatigue, flatulence, élévation des enzymes hépatiques et musculaires <b>Rares:</b> Réaction allergique, troubles hépatiques	A prendre à jeun ou avec les repas
<b>Elvitegravir</b>	Vitekta		Comprimés de 85, et de 150mg*	85mg une fois par jour avec de l'atazanavir/ritonavir ou du lopinavir/ritonavir ou 150mg une fois par jour avec du darunavir/ritonavir ou du fosamprenavir/ritonavir	1	<b>Fréquents:</b> Maux d'estomac, vomissements, éruptions cutanées, céphalées, diarrhées, nausées, fatigue <b>Rares:</b> Dépression, idées suicidaires, insomnie, troubles digestifs (dyspepsie), ballonnement, flatulence, vertiges, fourmillement, somnolence, sensation de goût étrange	A prendre avec les repas
<b>Raltégravir</b>	Isentress		Comprimés de 400mg	400mg deux fois par jour	2	<b>Fréquents:</b> Céphalées, insomnie (troubles du sommeil) <b>Rares:</b> Éruptions cutanées graves, réaction d'hypersensibilité, soif extrême	A prendre à jeun ou avec les repas

\*Préparations illustrées § Comprend le(s) comprimé(e) de ritonavir.

Des versions génériques sont disponibles pour certains de ces médicaments, par conséquent leurs apparences peuvent varier.  
Les rédacteurs ont pris toutes les mesures de prudence nécessaires à la production de ce document. Ni NAM, ni les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou déclarations incorrectes sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. L'inclusion de toute information sur un traitement ou une thérapie ne représente pas une validation de ce traitement ou de cette thérapie par NAM ou ses rédacteurs. Ces informations doivent toujours être utilisées en association avec des conseils médicaux professionnels.

Le tableau des médicaments est publié par une association appelée NAM. NAM publie des informations impartiales et actualisées pour les personnes travaillant dans le domaine du VIH & SIDA. Consultez notre site internet pour toute l'actualité du VIH et pour vous inscrire gratuitement à nos bulletins électroniques. Nous apprécions vos commentaires et suggestions sur nos ressources.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London, WC1X 8DP  
Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com

Nous remercions ViiV Healthcare qui a financé le développement de ce matériel. ViiV Healthcare n'a exercé aucun contrôle sur le contenu.