

# LE POINT SUR...

## L'INFECTION V.I.H. EN FRANCE : QUELQUES DONNÉES


A. LAPORTE\*, J. PILLONEL\*, V. GOULET\*, J.-M. NADAL\*\*, F. CAZEIN\*, F. LOT\*, F. DEYBACH\*\*\*

Depuis plusieurs années, on annonce un nombre de séropositifs vivant en France estimé à environ 110 000 personnes. Pourquoi ce nombre n'évolue-t-il pas? Combien de personnes séropositives ne connaissent pas leur statut sérologique? Combien de personnes séropositives sont prises en charge? Combien de personnes sont au stade SIDA?

Les quelques données qui suivent constituent des éléments de réponse à ces questions.

La population des personnes vivant avec le V.I.H. en France est appréhendée par différents systèmes d'information qui permettent d'établir la figure suivante :

Figure 1. - Estimation des personnes vivant avec le V.I.H. en France en 1995



La population *totale* des personnes atteintes par le V.I.H., quel que soit le stade de l'infection, comprend des personnes qui connaissent leur séropositivité et d'autres qui ne la connaissent pas. La taille de cette population totale ne peut être **estimée** qu'à partir de modélisation mathématique, elle serait environ de **110 000 personnes** (1) **vivantes** fin 1995.

La *taille* de la population des personnes vivant avec le V.I.H. varie peu depuis plusieurs années car le nombre annuel de nouvelles contaminations [estimé à environ 6 000] (1) est proche du nombre annuel de décès (2) [plus de 5 000 décès chez des personnes atteintes de Sida ou séropositives].

La population des personnes *dépistées*, c'est-à-dire connaissant leur séropositivité, comprend les personnes qui sont prises en charge médicalement et celles qui n'ont pas recours au système de soins. La taille de cette population n'est **pas directement connue**. Il n'existe pas en France de recensement des personnes découvertes séropositives. Cependant, une enquête auprès des laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers [R.E.N.A.V.I.] (3) permet d'évaluer, depuis 1988, l'activité annuelle de dépistage en nombre de tests réalisés et en nombre de tests confirmés positifs. Ainsi, à partir de cette enquête on estime que 7 000 à 8 000 personnes ont découvert leur séropositivité en 1995.

La population *des personnes prises en charge* médicalement est assez **bien connue**. Une enquête coordonnée par la direction des hôpitaux tous les trois ans (4) permet d'estimer la population des personnes prises en charge à l'hôpital ou en ville. Ainsi, pour l'année 1995, le nombre de personnes ayant consulté au moins une fois une structure de soins est estimée au plus à **80 000** (5).

La population des personnes au stade *Sida* de l'infection est **connue avec précision** grâce au système de surveillance national reposant sur la déclaration obligatoire des cas. Ainsi, pour l'année 1995, le nombre de personnes ayant développé un Sida, vivant au 1<sup>er</sup> janvier 1995 et celles ayant développé un Sida au cours de l'année s'élève à environ **21 000**.

Il reste 2 sous-populations pour lesquelles on ne dispose pas d'estimation directe de leur taille, ni de leurs caractéristiques, alors qu'elles sont une des cibles des actions de prévention.

Il s'agit de la population des *personnes atteintes par le V.I.H. qui n'ont pas réalisé le test* et celles des personnes qui sont *dépistées mais ne sont pas prises en charge médicalement*. Ces 2 populations regrouperaient 30 000 personnes (110 000 personnes atteintes dont sont soustraites les 80 000 personnes prises en charge).

Il n'est pas possible de quantifier ces 2 sous-populations, mais il est raisonnable de penser que le nombre de personnes ne connaissant pas leur séropositivité est bien supérieur au nombre des personnes non prises en charge.

En effet, la proportion de personnes ne connaissant pas leur statut sérologique au moment du diagnostic du Sida est de 22 % (6). Cette proportion est certainement plus élevée parmi les personnes qui sont à un stade moins avancé de l'infection, car la probabilité de connaître son statut sérologique augmente au cours du temps entre le moment de la contamination et le diagnostic du Sida.

On peut donc estimer qu'au moins 22 % des personnes séropositives non atteintes de Sida, soit environ 20 000 personnes, ne connaissent pas leur statut sérologique.

Cette méconnaissance du statut sérologique varie notamment selon le mode de contamination [mais aussi selon le sexe, l'âge, la région de domicile et la catégorie socioprofessionnelle] (6). Les utilisateurs de drogues injectables ont plus largement recours au dépistage que les homosexuels/bisexuels. Mais l'ignorance de la séropositivité avant le Sida est surtout fréquente chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes contaminées par voie hétérosexuelle. Ceci est d'autant plus important à souligner que le nombre annuel de nouvelles contaminations, d'après les résultats de modélisation (5), reste stable chez les personnes contaminées par voie hétérosexuelle, alors qu'il a diminué fortement chez les utilisateurs de drogues injectables et de façon plus modérée chez les homosexuels.

En conclusion, parmi les personnes vivant avec le V.I.H., environ 30 000 ne connaissent pas leur séropositivité ou la connaissent mais ne sont pas prises en charge. Pourtant l'apparition de nouvelles molécules antirétrovirales et de nouvelles stratégies thérapeutiques ne fait que renforcer l'importance du dépistage chez toute personne susceptible d'être contaminée et l'importance d'un suivi régulier chez toute personne contaminée.

Il est donc particulièrement important que les acteurs de prévention et ceux qui ont en charge le conseil et le dépistage conduisent des actions de sensibilisation plus ciblées et intègrent les spécificités d'attitudes propres à ces populations.

Les médecins généralistes et les dispositifs médicalisés auxquels ont recours les populations doivent être particulièrement sensibilisés au rôle qu'ils peuvent et doivent jouer.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur chacune de ces populations, vous pouvez :

- soit **consulter le site INTERNET** du Réseau national de Santé publique : <http://www.b3e.jussieu.fr/rnsp/sida> ;
- soit **téléphoner au RNSP** : 01 43 96 66 05.

\* R.N.S.P.

\*\* Direction des hôpitaux.

\*\*\* Direction générale de la santé.

(1) La modélisation de l'épidémie d'infection à V.I.H. Sida 2010. A.N.R.S. 1995, p. 105-127.

(2) E. Jouglu, I.N.S.E.R.M., communication personnelle.

(3) B.E.H., n° 39/96, p. 172-3.

(4) Enquête problèmes et besoins des patients V.I.H. - 1993. Ministère de la Santé.

(5) D<sup>r</sup> J. M. Nadal, communication personnelle.

(6) B.E.H., n° 46/95, p. 203.