

醫療追蹤



如果您感染了丙型肝炎病毒,您最好找一位肝臟專科醫師做為您專屬的醫師. 因為日後您必須定期的做常規病理追蹤,以隨時了解病毒在您體內的活動發展情形. 即時投予有效的藥物來對抗病毒,避免病毒在您體內造成嚴重的傷害(例如形成肝硬化)或有可以治癒的希望.

丙型肝炎的治療

- 目前對於丙型肝炎的治療是以投與兩種藥物為主的治療方法: 第二代干擾素 (Peg-interferon) 及抗病毒藥物 (ribavirine).
- 主要是以抵抗及阻撓病毒對肝臟繼續造成傷害. 在接受治療的個案中有 48 – 88 % 的個案是可以治癒的,此外還可以避免加快形成嚴重肝損傷的速度.
- 一般治療期依照個案情況的不同,期間可由 6 個月到一年不等.

您亦可參與仍在進行研究的治療藥物.

早期發現 早期治療

請注意,飲酒/酒精有增加丙型肝炎病毒對肝臟的破壞,酒精的毒害可以加快肝硬化的形成. 因此建議病患戒酒或只飲用極少量的飲酒.

甲乙丙型肝炎

最為常見的甲乙丙型肝炎病毒:

甲型肝炎(簡稱甲肝),甲肝病毒通常是經由飲用不潔淨的水源,或是使用被病毒感染的水源清洗的食物而引起;例如被含有病毒的排泄物所污染的水源. 但是通常甲肝可以在幾週內自然痊癒,一般而言,年齡越長者感染甲肝病毒的病況往往比年輕人來得嚴重. 有預防針劑可以預防甲肝病毒的感染.

乙型肝炎(簡稱乙肝), 乙肝病毒是經由血液,性接觸及母嬰等途徑傳播病毒. 90%被病毒感染的個案,可自然痊癒,1%的個案則可發展為嚴重的病程,甚至死亡. 一旦乙肝病毒的感染成為慢性肝炎,則個案可因此發展為肝硬化或肝癌. 如果孕婦為乙肝病毒帶原者,那麼她的嬰孩可給予預防性藥物治療. 有預防針劑可預防乙肝病毒的感染.

丙型肝炎(簡稱丙肝), 丙肝病毒是經由血液傳播病毒. 20%被病毒感染的個案可自然痊癒,但是很不幸的有 80%則可演變為慢性肝炎,並發展為嚴重而複雜的肝疾病;例如肝硬化常發展成肝癌. 被病毒感染後丙肝的病程發展可以經過很長的一段時間才發病. 如果患者沒有接受任何藥物的控制或醫療追蹤,就很容易發展成嚴重而複雜的肝疾病.

目前尚未有任何預防針劑可預防丙肝病毒的感染.

肝炎匿名諮詢專線(法語): 0 800 845 800
丙肝諮詢專門網站(法語): <http://www.sante.gouv.fr>
傳染病防治學會諮詢專線(漢語): 01 44 93 29 38
傳染病防治學會網站(法語): <http://www.arcatsante.org>

Arcat est une association membre du Groupe SOS
www.groupe-sos.org



丙型肝炎

早期發現

早期治療

Pour plus d'informations contactez Arcat
Association de recherche de communication et d'action pour l'accès aux traitements

您希望得到更詳細的資料歡迎與我們聯繫

所有資料諮詢服務完全免費

Add. 地址: 94-102, rue de Buzenval – 75020 Paris

Tél 電話: 01 44 93 29 38 (chinois 漢語)

Fax 傳真: 01 44 93 29 30

e-mail: asia@arcat-sante.org

<http://www.arcat-sante.org>

Document réalisé avec le soutien de la DASS et de la DRASIF

本會及巴黎市政府衛生局與大巴黎地區醫療保險總局聯合印制

© Arcat / Edition Mai 2003

肝炎的意思是指肝臟發生炎症反應(發炎)。它可以:

- 經由病毒感染(肝炎病毒)

甲型肝炎(簡稱甲肝)

乙型肝炎(簡稱乙肝)

丙型肝炎(簡稱丙肝)

- 也可以經由
飲酒酗酒造成酒精肝
某些藥物的毒性
脂肪消化問題造成脂肪不正常蓄積(脂肪肝)...

丙型肝炎

在法國約有 600 000 人,也就是有 1%的人感染丙肝病毒.

在這些被病毒感染的人群中,仍然有許多人不知道自己已被丙肝病毒所感染,也因為如此,受感染者任由病毒在人體內無聲無息的發展成嚴重而複雜的肝疾病. 事實上是有藥物可以治癒與控制丙肝病毒在人體內活動. 所以期望民眾能早期發現早期治療.

丙型肝炎目前是有希望治癒的.

如何感染丙型肝炎?

經由血液

主要是經由被丙肝病毒感染的血液.
靜脈注射毒品或經鼻孔吸食毒品者.
在法國經輸血感染丙肝病毒的機會是微乎其微.

被血液染污的器具

- 醫療院所消毒不完全的醫療器具.
- 與病毒帶原者/協帶者共同使用尖銳器具;例如針頭,刀片等,又或者共用牙刷,刮鬍刀,指甲刀....
- 刺青,紋眉,紋眼線,穿耳洞,鼻洞等美容院所使用的尖銳器具,或針灸院所使用的針頭,若消毒不完全都有傳染病毒的疑慮.



母嬰感染至今至少有個案.

經由性接觸的感染

雖然經性接觸感染的個案還不多,但仍有其可能性,例如女性於行經期(例如: 疱疹),或是性器官有開放性的傷口等.

日常生活的一般接觸是沒有任何被感染的危險,

例如親吻臉頰,一起吃飯,共用同個杯子喝水,握手...即使是被丙肝病毒感染的人 (即病毒協帶者) 亦可以與正常人一同正常的生活.

在甚麼情況下應做丙肝病毒檢驗

- 您曾在 1992 年以前做過外科手術,接受過心肺復甦,曾經腸胃道出血,生產困難,接受早產兒照護,小兒科急診,使用過血液制品或接受過器官移植.
- 您接受過血液透析治療.
- 您曾在東南亞,中東,非洲或南美洲等國家接受過上述的治療.
- 您是或曾是經由靜脈注射毒品或經鼻孔吸食毒品者.
- 您正生活在牢獄中或曾做過牢.
- 您曾經或是正和一位丙肝病毒感染者共同生活.
- 您曾刺青,紋眉,紋眼線,穿耳洞,鼻洞等或在消毒概念不健全的針灸院所做過針灸治療.



如果您必須做丙肝病毒檢驗

請向您的家庭醫師諮詢. 檢驗費將由健保局 100%給付.

您亦可前往免費匿名檢驗中心做檢驗 (CDAG)

抽血做丙肝病毒檢驗,可以讓您了解是否被丙肝病毒感染. 此外第一次檢驗結果,如果呈現陽性反應,並不能肯定您已被病毒感染,必須要再經過第二次的抽血檢驗才可以確認.