



PRATIQUE

Exemple d'utilisation de la réglette

Vous êtes sous multithérapie avec comme prescription du Combivir® (Retrovir® associé à l'Epiriv®), de l'Invirase® boosté par du Norvir®. Vous êtes également atteint d'une épilepsie, qui nécessite un traitement au phénobarbital (Gardenal®). En regardant sur la réglette avec le curseur sur «GARDENAL®», vous remarquez que, au niveau de l'Invirase®, vous aurez un point rouge, qui signifie une interaction importante entre le Gardenal® et le saquinavir, et également un point jaune au niveau du Norvir®, indiquant un risque d'interaction pouvant perturber l'efficacité de cette antiprotéase avec le phénobarbital.

# La réglette d'interactions médicamenteuses : Comment (et quand) l'utiliser...

par Eugène Rayess  
redaction@actions-traitements.org

Actions Traitements a édité récemment la dernière version de la réglette d'interactions médicamenteuses entre les médicaments d'usage courant et les antipro-téases... L'importance d'un tel outil est évidente dans la prise en charge au quoti-dien de l'infection à VIH compte-tenu de la complexité des schémas thérapeutiques actuels...



ue l'on soit m é d e c i n , infirmier(e),

multithérapie anti-VIH contient une antiprotéase (Viracept®, Invirase®, Fortovase®, Kaletra®, Agénérase®, Norvir® ou Crixivan®) ou une association de ces

### Utilisation de la réglette

Au recto, la réglette présente une liste de médicaments, avec, à

, à on CI. 0). le se de ser es s. es nt ns iez nt its ce de ts on et re

tre tir un ie re le ut il), ssi es

